

Администрация МО город Армавир и Южное межрегиональное управление
Россельхознадзора призывает всех включиться в борьбу с амброзией
полыннолистной

Амброзия полыннолистная сегодня не только на полях, она растет в населенных пунктах, на обочинах дорог, на строительных площадках, на пустырях, вокруг школ и детских садов. В период цветения амброзия вызывает массовые аллергические заболевания (риниты, бронхиты, бронхиальную астму). Вдыхание цветочной пыльцы амброзии полыннолистной вызывает тяжелое воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей и глаз, головную боль, приступы бронхиальной астмы, сенную лихорадку и дерматиты.

Так же она причиняет много вреда сельскому хозяйству:

- снижает урожай,
- портит корма,
- сильно иссушает и обедняет почву.

Одно растение образует 60-80 тысяч семян, способных сохранять всхожесть более пяти лет.

Поэтому руководителям предприятий всех форм собственности и жителям города необходимо проводить работы по обследованию земельных угодий на выявление злостного сорняка и своевременно уничтожать его.

С амброзией полыннолистной необходимо бороться до начала ее цветения, учитывая биологические особенности данного сорняка. Наиболее эффективным методом борьбы в настоящее время является удаление ее с корнем. Скашивание, как метод борьбы с амброзией полыннолистной, малоэффективен, так как она отрастает, давая при этом от 5 до 15 новых побегов, однако если этот прием проводить многократно и систематически, то удастся предупредить цветение и плодоношение амброзии.

На посевах с/х культур агротехнические меры борьбы имеют решающее значение для ликвидации амброзии полыннолистной. Они включают в себя правильное чередование культур в севообороте, обработку почвы, уход за посевами. Здесь важно своевременно применять весь комплекс агротехнических мероприятий в сочетании с химическими мерами борьбы, а при необходимости и ручную прополку.